

----- (はじまり) -----

タケシ「せんぱーい。ちょっと聞いていいですか？」

アスカ「何？」

タケシ「先輩ってブラジャーを着けてる時間はどれくらいなんですか？」

アスカ「・・・！？何よ、いきなり」

タケシ「一日中なんですか？それとも寝るときはxがh 9 え s！痛いっす」

アスカ「いくらなんでも、ぶっきらぼうでしょ。レディーに！」

タケシ「ご、ゴメンなさい。開けっ広げに聞いたほうが先輩のノリに合ってるかと思って」

アスカ「ほんとバカね。...で、何？何でそんなこと聞くの？」

タケシ「ブラジャーの着用時間と乳癌との関係について興味深いニュースを見つけたんですよ」

アスカ「へー。言ってみなさいよ」

タケシ「じ、じゃあ。えっと、何でも一日中ブラジャーを着けている女性は全く着けていない女性に比べて126倍も乳癌になるリスクが高いそうなんですよ」

アスカ「えっ、そんなに高いの！？だって、ブラの説明には形が崩れないようにって...」

タケシ「形が何ですか？」

アスカ「な、なんでもないわよ。じゃ、寝るとき外す人はどうなのよ」

タケシ「えっと、24倍です」

アスカ「それでもそんなに高いの！？ちゃんとした調査なの？調査人数はどれくらいなのよ」

タケシ「ちゃんとメモってますよ。アメリカの研究で健康な女性2674人と乳癌の女性2056人の合計4730人からのアンケートが元ですね」

アスカ「見た目、サンプル数は十分ね。他の着用時間での調査は？」

タケシ「えっと、ちょっと待ってください。あった！まとめた表がコレです」

ブラジャーの着用時間	乳癌罹患率	
24時間	3/4	(75%)
12時間以上(就寝時未着用)	1/7	(14.3%)
12時間未満	1/152	(0.66%)
全く/ほぼ着用しない	1/168	(0.6%)

アスカ「24時間着けている人は4人中3人が乳癌ってこと？12時間未満なら152人中1人が…。ふーん。12時間未満なら劇的に乳癌の発症率が下がるのね。目からウロコだわ」

タケシ「でしょ。意外に盲点ですよ。ブラジャーが原因って」

アスカ「でも、4730人の振り分けは？ブラジャーを全く使わない人って、とても希だと思うけど…。だって、ノーブラだよ。仕事中也」

タケシ「そ、そうなりますね。でもニュースではそこまで言ってなくて…。論文まで探ろうと思ったんですけど、仕事じゃないから時間が割けなくて」

アスカ「ふーん。それでも少しは分かるわよ。全く着用しない人が1/168ってことは、ノーブラ派が最低168人はいたってことよね。実際、ほとんどの女性はブラジャーを着けるでしょうから、4730人中168人の3.5%はありそうな数字かもね」

タケシ「すると、100人中3人はノーブラになりますよね？」

アスカ「何、鼻の下伸ばしているのよ。アメリカの調査だから日本は違うかもしれないじゃない。あ、それに確か健康な女性と乳癌の女性の数って同じくらいだったよね」

タケシ「えっと、2674人と2056人です。後の数字が乳癌の女性ですけど、何か気になることでも？」

アスカ「乳癌って2人に1人の割合でなるような病気だと思う？昔、興味があって調べたときは18人に1人くらいの割合だったんだけど」

タケシ「そうなんですか？すると妙に乳癌の人のアンケート数が多いですね」

アスカ「そうなのよ。乳癌の人ばかり集めてアンケートすれば当然、乳癌の罹患率は増えるよね」

タケシ「眉唾なアンケート結果ってことですか？」

アスカ「前に調べたときに乳癌発症率は女性全体で2人に1人っていう人もいたくらいだから、強ち間違っていると決め付けるのはどうかと思うけどね。それに仮に全員が乳癌だとしても3/4と1/168の差を偶然と考えるのはちょっとね」

タケシ「なるほど…。着用時間毎の人数が分かればいいんでしょうけど…。今度、時間があったら調べてみます」

アスカ「そうね。興味のある調査だから分かるとスッキリするわ。でも、どうしてブラジャーを着けている時間が多いと乳癌になるのかしら…」

タケシ「ブラジャーのワイヤーでリンパ線を圧迫するからだそうですよ。毒素って脂肪に集まりやすいから、圧迫することで蓄積・癌化するらしいんですが、女性の胸ってほとんど脂肪なのに加えて、乳房のリンパ腺は皮膚に近いので圧迫されやすいんだそうですよ」

アスカ「へえー、もっともな理由があるんだ。勉強になったよ。ありがと」

タケシ「先輩に礼なんて、とんでもないです。ところで、アスカ先輩のブラジャー着用時間ってどれく g ; ひう h g k !」

アスカ「だから、レディーに失礼でしょ」

タケシ「でも先輩…、鉄の女って噂が x 1 g p 7 c h っ! ずみません…」

----- (つづく) -----